

27-6-08

Aumentan los casos de sida por contagio de hombre a hombre



Una 'segunda oleada' de la epidemia de sida está diezmando a la comunidad homosexual estadounidense. Entre 2001 y 2006, los nuevos diagnósticos de infección por VIH aumentaron a un ritmo de un 12% anual

ELMUNDO.ES | REUTERS

MADRID | NUEVA YORK.- Los expertos tienen la impresión de que una 'segunda oleada' de la epidemia de sida está diezmando a la comunidad homosexual estadounidense. Y los últimos datos publicados por los CDC (los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas) indican que no van desencaminados. Entre 2001 y 2006, los nuevos diagnósticos de infección por VIH aumentaron en los hombres que tienen sexo con otros varones a un ritmo de un 12% anual.

Mientras el número de contagios ha descendido en los otros colectivos y por las otras vías, los **chicos entre 13 y 24 años** que tienen relaciones con personas de su mismo sexo (sin que por ello sean necesariamente homosexuales) se han convertido en el objetivo preferido del virus. Según el informe, publicado en 'Morbidity and Mortality Weekly Report' y que recoge datos de 33 estados, los hombres más afectados son los afroamericanos, donde el aumento de los contagios alcanza el 15%.

"Estos hombres representan a una nueva generación que no había sido afectada personalmente por el virus en la misma manera que sus antepasados", ha declarado a [The Washington Post](#) Richard Wolitski, director del área de VIH de los CDC.

"Cuando ves un **incremento de hasta un 15% anual** está claro que la epidemia está fuera de control", añade al mismo diario Phill Wilson, del Instituto del Sida en la Comunidad Negra de Los Ángeles.

En concreto, el 46% de los 214.379 diagnósticos de VIH que se realizaron en EEUU durante los cinco años estudiados correspondieron a varones que mantuvieron sexo con varones.

"Para cambiar esta tendencia es necesario reforzar las estrategias de prevención y, sobre todo, conseguir que lleguen a los más afectados, que son los hombres que pertenecen a las minorías étnicas", indican las autoridades sanitarias en su informe, donde también insisten en la importancia de realizarse la prueba del sida.